

VACINA CONTRA O VÍRUS VARI- CELA ZOSTER

Previne doença que causa varicela.

VACINAS

Varivax® (PVP aproximado 48,27€ por dose); Varilrix® (PVP aproximado 41,99€ por dose).

ADMINISTRAÇÃO

Por injeção intramuscular.

A partir dos 12 meses de idade.

CONTRAINDICAÇÕES

Reação anafilática prévia; Imunossupressão; Grávidas; crianças < 1 ano; Terapêutica crónica com salicilatos; Tuberculose ativa não tratada.

REAÇÕES ADVERSAS MAIS FREQUENTES

Locais (dor, eritema, edema); Rash local ou generalizado; Herpes zoster.

VACINA CONTRA O VÍRUS DA GRIPE

VACINAS

A vacina contra a gripe apresenta uma composição variável de ano para ano, de acordo com as estirpes que se preveem ativas nesse ano.

As diferentes especialidades farmacêuticas existentes no mercado não são as mesmas todos os anos. A época de vacinação decorre a partir do início de Outubro.

ADMINISTRAÇÃO

Por injeção intramuscular.

Anualmente.

A partir dos 2 meses de idade.


CONTRAINDICAÇÕES

Reação anafilática prévia (excipientes ou proteína do ovo); Ponderar risco/benefício em caso de Síndrome Guillan-Barré prévio. Gestação inferior a 12 semanas.

REAÇÕES ADVERSAS MAIS FREQUENTES

Locais (dor, eritema, induração); Queixas sistémicas (febre baixa, fadiga, mialgia, arrepios).

USF VALONGO



VACINAS EXTRA PROGRAMA NACIONAL DE VACINAÇÃO




Autoras: Enf Inês Filipe

Data de elaboração: Junho 2015

Revisão: Maio 2017

Data da próxima revisão: 2021



VACINA CONTRA O VÍRUS DA HEPATITE A

Previne doença que causa hepatite A.

VACINAS DISPONÍVEIS

Havrix® (PVP: Preço aproximado 17,71€ por dose); Epaxal® (PVP aproximado: 20,79€ por dose).

ADMINISTRAÇÃO

Por injeção intramuscular.

A partir dos 12 meses de idade.

CONTRAINDICAÇÕES

Reação anafilática prévia; Nas grávidas ponderar risco/benefício.

REAÇÕES ADVERSAS MAIS FREQUENTES

Locais (dor, eritema, edema); Queixas sistémicas (febre baixa, fadiga).



VACINA CONTRA NEISSERIA MENINGITIDIS SEROGRUPO B

Previne doença que causa doença invasiva meningocócica (DIM) e/ou sepsis. (infecção generalizada).

VACINAS DISPONÍVEIS

Bexsero® (PVP aproximado: 95,06€ por dose)



ADMINISTRAÇÃO

Por injeção intramuscular.

A partir dos 2 meses de idade.

EFEITOS SECUNDÁRIOS MAIS FREQUENTES

Perda de apetite, sonolência, choro involuntário, diarreia, vômitos, erupção cutânea, febre e irritabilidade, bem como sensibilidade, tumefação, induração e vermelhidão da pele no local de injeção.

CONTRA-INDICAÇÕES

Hipersensibilidade a algum componente da vacina; Vacinas contra pneumococo serotipo 6B, vírus polio inativado tipo 2 e pertactina.

VACINA CONTRA ROTAVÍRUS

Previne doença que causa gastroenterite aguda.

VACINAS DISPONÍVEIS

RotaTeq® (PVP aproximado : 51,18€ por dose); Rotarix®(PVP aproximado: 71,08€ por dose).

ADMINISTRAÇÃO

Oral.

Até aos 6 meses de vida.

EFEITOS SECUNDÁRIOS MAIS FREQUENTES

Vômitos; Diarreia; Irritabilidade; Febre

CONTRA-INDICAÇÕES

Hipersensibilidade a algum componente da vacina

Alergia ao látex (na Rotarix®).

